

Checklista Comirnaty – ver.5 20210126

Innehåll

- Om vaccinet Comirnaty
- Distribution av Comirnaty
- Hantering av Comirnaty
- Rutin vaccination SÄBO
- Material för iordningställande och injektion
- Skyddsutrustning
- Anafylaxiberedskap
- Hanteringsanvisningar
- Dosering
- Administreringssätt/vaccination
- Kassation
- Kyllåda
- Biverkningar
- Länkar
- Mer information

Om vaccinet Comirnaty

- Comirnaty är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV-2-viruset hos personer 16 år och äldre.



Distribution av Comirnaty

- Comirnaty är mycket känsligt och måste hanteras varsamt för att bibehålla kvaliteten i alla led i distributionskedjan!
- Injektionsflaskorna ska förvaras stående, även under transport
- Vårdcentralerna ansvarar för att tillhandahålla kylväska med kylklampar vid transport så att vaccinet håller kylskåpstemperatur (2-8 grader)

Hantering av vaccinet Comirnaty

- Kylskåp, måste finnas tillgängligt, för förvaring av vaccin.
- Corminaty är hållbart i upp till 5 dygn (120 timmar) i kylskåpstemperatur från det datum och klockslag som angivits på ytterförpackningen. Hållbarhet i rumstemperatur efter spädning 6 timmar.
- Corminaty blandas med Natriumklorid injektionsvätska 1,8 ml som dras upp med grön eller blå kanyl och 2-ml-spruta
- Dra ut 1,8 ml luft
- Den blå kanylen och 1-ml-sprutan används både för att dra upp Corminaty ur den färdigberedda injektionsflaskan och för att ge vaccinet till patienten

Hantering av vaccinet Comirnaty

- Enligt FASS innehåller injektionsflaskan 6 doser
- Använd grön eller blå kanyl för att tillsätta natriumklorid
- Observera – blanda inte innehåll från olika injektionsflaskor till samma dos

Rutin vid vaccination SÄBO

- Teamet från VC tillsätter natriumklorid injektionsvätska enligt blandningsinstruktionen.
- En injektionsflaska med natriumklorid kan användas till fler injektionsflaskor med vaccin om de iordningställs samtidigt, därefter kasseras den direkt. Om man enbart iordningställer en injektionsflaska med vaccin ska injektionsflaskan med natriumklorid kasseras direkt efter iordningställandet. Uppdragningskanylen kasseras.
- Sjuksköterska på SÄBO administrerar vaccinet
- Vaccinet registreras i Svevac och dokumenteras i NCS Cross. Om vaccin blir över – ges till närvarande personal.
- VC-teamet och SÄBO kommer överens om när nästa dos, dos 2, ska ges (efter 3 veckor)

Material för iordningställande och injektion

Allt material förvaras vid de utpekade distributionsvårdcentralerna och hämtas där.
Mängden material är beställt utifrån antal beställda vaccindoser.

- Från FLOTT/varuförsörjningen
 - Injektionstorkar
 - Plåster 38x38 mm
 - Spruta 1 ml (för att ge vaccinet)
 - Spruta 2 ml (för att tillsätta natriumklorid)
 - Punktionskanyl 21G grön eller 23G blå (för att tillsätta natriumklorid)
 - Injektionskanyl, 23G blå (för att ge vaccin)
 - Sprutfat
 - Spartork
 - Etiketter (får användas t.o.m.)

För iordningställande och injektion

- Vaccin beställs av samordnare:
vaccinbestallning@regionsormland.se
- Vaccinerande enhet beställer själv från Sjukhusapoteket via Proceedo:
 - Natriumklorid spädningsvätska för parenteral anv. 9 mg/ml 20x10ml
043919
 - Ange aktivitetskod: 10957
- Privata Vårdcentraler beställer natriumklorid spädningsvätska via
vaccinbestallning@regionsormland.se

Skyddsutrustning från FLOTT/varuförsörjningen

Allt material förvaras vid de utpekade distributionsvårdcentralerna och hämtas där.

- Handskar (byts mellan varje patient)
- Munskydd och visir (munskydd kan användas i max fyra timmar)
- Skyddsrock (plastförkläde utan ärm, byts mellan varje patient)
- Övrigt från FLOTT/varuförsörjningen
 - Avfallskärl + etiketter för avfall
 - Handsprit (beställs på vanligt sätt av enheterna själva)

Anafylaxiberedskap

- Läkemedel
 - Adrenalinpenna, t.ex. Emerade 300 mikrog, minst 2 st
 - Betapred tabl 0,5 mg
 - Loratadin munsönderfallande tabl. 10 mg (eller annan antihistamin)
- Instruktion se "*Generellt direktiv om läkemedelsbehandling vid Anafylaxi i samband med vaccination*" på [Samverkanswebben](#)
- FASS-text, produktresumé och bipacksedel finns på [FASS Vårdpersonal – Start sida](#), sök på *Comirnaty* eller klicka på denna direktmlänk, <https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20201005000062&docType=6&scrollPosition=587>


Före spädning

- Låt den upptinade injektionsflaskan anta rumstemperatur och vänd försiktigt 10 gånger före spädning. Får ej skakas.
- Före spädning kan den upptinade lösningen innehålla vita till benvita, ogenomskinliga amorfa partiklar.



Spädning


- Det upptinade vaccinet måste spädas i den ursprungliga injektionsflaskan med 1,8 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning med hjälp av en 21G grön eller 23G blå nål samt aseptisk teknik.



**1,8 ml 0,9 % natriumklorid
injektionsvätska, lösning**

Spädning


- Jämna ut trycket i injektionsflaskan innan du drar ut nålen ur injektionsflaskan genom att dra upp 1,8 ml luft i den tomma sprutan som innehöll spädningsvätskan.



Dra tillbaka kolven till 1,8 ml för att avlägsna luft ur injektionsflaskan

Efter spädning

- Efter spädning, vänd försiktigt den dispersionen 10 gånger. Får ej skakas.
- Vaccin efter spädning ska vara en benvit dispersion utan synliga partiklar.
- Kasta det utspädda vaccinet om det innehåller partiklar eller är missfärgat.



Uppmärkning


- De utspädda injektionsflaskorna ska märkas med datum och tidpunkt för beredning av vaccinet, samt datum och tidpunkt för kassering
- Frys inte och skaka inte den utspädda dispersionen.
Vid förvaring i kylskåp, låt den utspädda dispersionen anta rumstemperatur före användning.



Anteckna datum och tidpunkt för beredning av vaccinet

Beredning av enskilda 0,3 ml-doser av Comirnaty

- Efter spädning innehåller injektionsflaskan 2,25 ml motsvarande 6 doser à 0,3 ml. Dra upp den önskade 0,3 ml-dosen av utspätt vaccin med en steril nål.
- Kasta allt oanvänt vaccin inom 6 timmar efter spädning.



Dosering

- Personer 16 år och äldre
 - Comirnaty administreras intramuskulärt efter spädning som en vaccinationsserie bestående av 2 doser (0,3 ml vardera) med minst 21 dagars mellanrum
 - Individer som har fått 1 dos Comirnaty ska ges en andra dos Comirnaty för att fullborda vaccinationsserien.

Administreringssätt/vaccination

- Comirnaty ska administreras intramuskulärt.
- Det föredragna stället är deltoideusmuskeln i överarmen.
- Injicera inte vaccinet intravaskulärt, subkutant eller intradermalt.
- Vaccinet ska inte blandas i samma spruta som andra vacciner eller läkemedel.
- Noggrann observation i minst 15 minuter efter vaccination rekommenderas. De som upplevt en anafylaktisk reaktion efter den första dosen Comirnaty ska inte ges en andra dos av vaccinet.

Kassation

- Glasflaskor (även tomma) ska kasseras som läkemedelsavfall "cytostatika och läkemedelsförorenat avfall" eller "stickande/ skärande" (slängas i gula avfallsboxar)
- Eftersom förpackningarna betraktas som stöldbegärliga ska dessa destrueras
 - Injektionsflaskor: rita med vattenfast penna på vaccinflaskorna så att de ej kan återanvändas och säkerställ hanteringen av riskavfallet

Retur av kyllåda

- Kyllådan returneras snarast enligt normalrutin.

Biverkningar

- Hälso- och sjukvårdens anmälan om läkemedelsbiverkan:
<https://www.lakemedelsverket.se/sv/blanketter/sok-blanketter/biverkningsrapportering-for-halso--och-sjukvard>
- Patientens anmälan om läkemedelsbiverkan:
<https://www.lakemedelsverket.se/sv/blanketter/sok-blanketter/biverkningsrapportering-for-patient-och-konsument>
- Skicka alltid en kopia till Funktionsbrevlåda PSE:
patientsakerhetsenheten@regionsormland.se

Länkar till mer information

- [Fass](#)
- [Läkemedelsverket](#)
- [Folkhälsomyndigheten](#)
- [Hälsodeklaration](#)
- [Lathund för att bedöma svaren på Hälsodeklaration](#)

Mer information

- **Mer information på samverkanswebben**

- Här hittar du medicinsk information och information till patienter så snart det finns framtaget. Sidan uppdateras löpande. [Coronavirus covid-19 vaccination - Sörmland - Samverkanswebben \(regionsormland.se\)](https://regionsormland.se/coronavirus-covid-19-vaccination)

- **Funktionsbrevlåda för fler frågor**

- Har du frågor kan du höra av dig till: vaccinationcovid@regionsormland.se