

Rutiner vid avsaknad av permanenta tänder

Patienter som saknar permanenta tänder, t.ex. på grund av aplasi/agenesi, trauma eller grava tandutvecklingsstörningar, ska visas för eller remitteras till ortodontist.

Behandling

Protetisk behandling och implantatterapi får ses som sista möjliga alternativ när andra terapiformer uteslutits. I de fall där detta inte bedöms möjligt för att uppnå ett tillfredställande resultat med luckslutning utförs halvpermanent ersättning som bärs till dess att patienten nått en tillväxt där implantatterapi bedöms lämplig att utföra.

- Luckslutning är förstahandsalternativ.
- Implantatbehandling eller icke-reversibel protetisk behandling är andrahandsalternativ.

Omhändertagandekedja

1. Alla patienter med aplasi/agenesi eller tandförluster på grund av trauma eller andra orsaker bör diskuteras med ortodontist för terapiplanering snarast efter diagnos.
2. Vid behov diskuterar och planerar ortodontisten lämplig behandling i samråd med andra specialister. Samtliga patienter där implantatterapi övervägs ska diskuteras med specialist i oral protetik.
3. Patientens ansvarige tandläkare får via specialisttandvården upplysning om behandlingens planering och utförande.

Ersättning

Behandling med implantatprotetik som har blivit godkänd av specialist i Folktandvården Sörmland ersätts enligt Region Sörmlands ersättningslista för tandvårdsstöd i de fall vården utförs i allmäntandvården.