

Handläggare
Agneta Schultz

Dokumentdatum
2019-09-30

Giltig från
2019-10-30

Dokumentnummer
19-4849

Dokumentansvarig
Läkemedelskommittén

Dokumentkategori
Vårdrutin

RS-LED19-2941-1
Revisionsnummer
01

Beslutad av
Verkställighetsbeslut, Anna Ormegard, divisionschef Primärvård, Björn Lundahl medicinsk rådgivare Hälsoval

Generellt direktiv om läkemedelsbehandling vid Anafylaxi i samband med vaccination

Generellt direktiv om läkemedelsbehandling vid anafylaxi i samband med vaccination för hemsjukvård och särskilda boenden i kommuner i Sörmland, utifrån Anafylaxi 2015, Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA

Målgrupp: Distriktssköterskor/sjuksköterskor i samtliga kommuner i Sörmland

Detta generella direktiv om läkemedelsbehandling vid anafylaxi ska finnas i anslutning till akutsk eller i "akut- och buffertförråd" och medtas när vaccination ges.

Vanliga orsaker till anafylaxi: Födoämnen, bi- och getingstick, läkemedel (exempelvis vaccin)

Adrenalin är det viktigaste läkemedlet och ska ges tidigt och intramuskulärt i låret.

Indikation	Läkemedel	Adm.sätt	Dos vuxna	Effekt
Kraftig urtikaria Andnöd Hypotension Allmänpåverkan Kraftiga buksmärtor och kräkningar	Adrenalinpenna	Intramuskulärt i lårets utsida	Vuxen 300 µg	Inom 5 min. Upprepas vb. var 10 minut
	T. Aerius munlöslig 5 mg (eller annan antihistamin i dubbeldos)	Per os	2 tabletter (= 10 mg)	Inom 30-60 min
	T. Betapred, betametason, 0,5 mg	Per os (tuggas, sväljes hela eller löses i vatten)	10 tabletter (= 5 mg)	Först efter 2-3 tim.
Astma	Patientens egen bronkvidgande medicin	Inhalation pulver/spray	4-6 doser	Inom 5 min. Upprepas vb. var 10:e minut

Vid anafylaxi ska patienten akut till vårdcentral eller sjukhus. Ring 112.

Reviderad av Expertgrupp Läkemedelshantering och Expertgrupp Allergi och Andningsvägar oktober 2019