



Självtester klamydia och gonorré i Region Sörmland

Region Sörmland har tidigare upphandlat tjänsten med självtester för klamydia och gonorré från Synlab via testadighemma.se. Detta avtal upphör 2022-11-30 och tester som har beställts under tiden kommer att kunna analyseras under hela december.

Region Sörmland har i stället valt att nyttja befintlig tjänst via Inera och Egen provhantering och därmed bedriva tjänsten i egen regi. Denna tjänst används redan av 15 regioner och ytterligare 4 regioner (inklusive Sörmland) kommer starta upp inom kort.

Nytt från och med 2022-12-01

Från och med 1 december 2022 beställer invånaren sitt självtest via 1177.se och Egen provhantering genom att:

- Logga in på 1177.se
- Gå till Egen provhantering
- Klicka på ”Beställ provtagning och se svar”
- Klicka på ”Beställ och registrera”
- Invånaren väljer sen erbjudande ”För dig med penis. Provtagningskit för klamydia/gonorré” eller ”För dig med slida: Provtagningskit för klamydia/gonorré”

Alternativt så kan man klicka på den länk som kommer att finnas på informationssidan om hur man beställer ett självtest klamydia och gonorré på 1177.se. Länk som man kan använda är: <https://pep.1177.se>

Invånaren kommer som tidigare att få hem ett omärkt kuvert innehållandes en kartong med testkit antingen för penis eller slida. Invånaren följer provtagningsinstruktionen, registrerar sitt testkit och skickar in provet i det förfrankerade kartongen till Unilabs.

Provsvar

Så fort ett prov är analyserat går ett provsvar till invånaren via 1177.se. Rekommendation är att invånaren har ställt in notifiering via SMS och/eller e-post så får de ett meddelande när det finns ett provsvar.



Samtidigt går provsvar till NCS Cross i Sektionen för självtester Sörmland RHKS (under Kliniken för reumatologi samt hud- och könssjukdomar) och till arbetslistan i Egen provhantering som bevakas av Smittspårningsenheten.

Positiva provsvar

- Unilabs meddelar direkt till Könsmottagningen respektive Kvinnokliniken om det är ett positivt provsvar för gonorré. Invånaren blir då kontaktad av respektive klinik och får en bokad tid för behandling.
- I det positiva provsvaret för klamydia hänvisas patienten till Ungdomsmottagningen (upp till 23 år) eller primärvården.

Bevakning provsvar

Smittspårningsenheten har i uppdrag att bevaka att patienten har läst sitt provsvar, vilket sker i arbetslistan i Egen provhantering.

Behandling / Övertagande av behandlingsansvar

OBS! Gäller endast de självtester som beställs från och med 2022-12-01 och där invånaren är folkbokförd i Sörmland.

När patient med ett positivt provsvar har varit på mottagning för att påbörja behandling, ska den behandlande läkaren, medicinsk sekreterare eller annan vårdpersonal (med giltigt siths-kort och medarbetaruppdrag Vård och behandling) direkt i samband med ett besök göra ett "Övertagande av behandlingsansvar".

Smittspårningsenheten har i uppdrag att bevaka (samt skicka påminnelser, göra paragrafanmälan) att patienter med positivt provsvar söker vård för att få behandling.

Så fort övertagandet är skickat ser Smittspårningsenheten det i arbetslistan i Egen provhantering.

Övertagande av behandlingsansvar

Med detta meddelande intygas att du övertagit behandlingsansvaret för patient med klamydia- och/eller Gonorréinfektion som har testat sig via hemtest via 1177e-tjänster. Du intygar att mottagningen och namngivnen behandlare har övertagit ansvaret för behandling, smittspårning samt SmiNet anmälan för angiven patient.

Det är viktigt att detta meddelande skickas så snart patienten besökt mottagningen och smittspårning och behandling påbörjats. Utan besked om övertagande av behandlingsansvar kontaktas patienten vilket kan orsaka onödigt dubbelarbete.

Informationen skickas krypterad.

Patient som behandling och partnerspårning ansvaras för

Personnummer

Vårdenhet som tagit över ansvaret

Namn på vårdenheten

Telefonnummer till vårdenhet

Startdatum för behandling

Ansvarig vårdpersonal


Registrerat av

De uppgifter som behöver fyllas i är de gråmarkerade rutorna.

Åtkomst till Övertagande av behandlingsansvar (självtest klamydia/gonorré)

Alternativ 1:

Länk till "Övertagande av behandlingsansvar" hittar ni under Insidan som ett verktyg (se bild nedan). För att få åtkomst till verktyget måste ni klicka på namnet under profiltiteln och där väljer ni "Övertagande av behandlingsansvar (självtest klamydia/gonorré)" som ett valbart verktyg och sen Spara. Då har ni det verktyget alltid tillgängligt via Insidan oavsett vilken dator ni arbetar vid.



Alternativ 2:

Ett annat sätt är att ni sparar nedanstående länk som en favorit i webbläsaren (Edge).

<https://pep.1177.se/rba>

Smittspårning

Smittspårningsenheten har i uppdrag utöver bevakning av lästa provsvar och bevakning av övertagande av behandlingsansvar möjlighet att hjälpa till med smittspårning.

Gäller från och med 2022-12-01.

- Hud- och könsmottagningen
Smittspårningsenheten smittspårar alla patienter med självtester direkt efter övertagande av behandlingsansvar. För prover tagna på mottagning skickas remiss för smittspårning, enligt utsänd rutin.
- Primärvården
Smittspårningsenheten smittspårar alla patienter med självtest direkt efter övertagande av behandlingsansvar. För prover tagna inom primärvården skickas remiss för smittspårning, enligt utsänd rutin.



- Ungdomsmottagning
Smittspårar själva enligt befintlig rutin. Önskar man hjälp skickas remiss om smittspårning till Kuratorsmottagningen, Paramedicin MSE.
- Kvinnokliniken
Smittspårar själva enligt befintlig rutin. Önskar man hjälp skickas remiss om smittspårning till Kuratorsmottagningen, Paramedicin MSE.



Provtagning och analys gällande klamydia och gonorré i Region Sörmland

Här nedan presenteras kortversion av flödet för provtagning på mottagning och provtagning via hemtest.

1. **Patient kan söka regionens sjukvårdsmottagningar för att lämna prov.** Vid misstanke kan läkare också ordinera prov exempelvis vid ensidig ögoninflammation. Prov tas även vid screening exempelvis vid Mödravårdscentraler.
 - a. Provet tas då på mottagningen och provsvar meddelas patienten vid kontakt med mottagningen.
 - b. Antibiotikabehandling initieras av läkare på mottagning
 - c. Läkaren inleder smittspårning alternativt remitterar till smittspårare.
 - d. Om patienten inte efter flera telefonsamtal och brev inte får behandling eller inte deltar i smittspårning ska läkaren/smittspåraren anmäla detta till Smittskyddsläkaren. Läkaren/smittspåraren har då fyllt sin uppgift.
 - e. Smittskyddsläkaren startare ett ärende och utför åtgärder enligt smittskyddslagen.



2. **Patient kan också testa sig via hemskickat testkit.** Vid så kallat hemtest kan prov enbart tas för att diagnosticera bakterierna i urin och könsorganen däremot inte om man misstänker infektion i svalg, öga eller analt. Gäller endast person som är folkbokförd i Sörmland och som har en adress i Sverige.

- a. Invånaren beställer sitt testkit via 1177.se och Egen provhantering. Testkitet innehåller instruktion för hur provet tas och hur man registrerar provet samt frankerad kartong för att skicka in provet till laboratoriet.
- b. Invånaren tar provet och skickar in det.
- c. Invånaren får sitt provsvar via 1177.se.
- d. Erhåller invånaren ett positivt provsvar för gonorré kommer invånaren att bli uppringd av vårdenhet.

Erhåller invånaren ett positivt provsvar för klamydia ska hen söka vård i första hand på en ungdomsmottagning (upp till 23 år) och primärvården.

Smittspårningsenheten bevakar att invånaren läst provsvaret och att invånaren har fått behandling.

- e. När patienten sökt läkare ska denna
 - i. Ge antibiotikabehandling
 - ii. Genomföra ett Övertagande av behandlingsansvar
 - iii. Genomföra smittspårning enligt rutin *

** Gäller ej Könsmottagningen och primärvården där Smittspårningsenheten påbörjar smittspårningen så fort övertagande av behandlingsansvar är skickat.*

- f. Om patienten inte söker läkare inom 1-2 veckor ska Smittspårningsenheten söka kontakt med invånaren för att förvissa sig om att läkarkontakt tas.
 - i. Om sådan kontakt inte genomförs ska Smittspårningsenheten anmäla detta till Smittskyddsläkaren.
 - ii. Smittskyddsläkaren tar över ansvaret för åtgärder enligt smittskyddslagen.