

Typ 2-diabetes – behandlingsalgoritm Sörmland

Rökstopp och levnadsvanor					
Metformin					
Uttalad fetma (BMI ≥ 35 kg/m ²)	Manifest kardiovaskulär sjukdom	Hjärtsvikt	Övriga t ex normal-viktig utan komplex samsjuklighet	Nedsatt njurfunktion (eGFR < 30 ml/min)*	Mest sjuka äldre
Liraglutid (Victoza) Semaglutid (Ozempic) HbA1c-sänkning 10-15 mmol/mol Viktnedgång Låg hypoglykemirisk Gastrointestinala bieffekter	Liraglutid (Victoza) Semaglutid (Ozempic) HbA1c-sänkning 10-15 mmol/mol Viktnedgång Låg hypoglykemirisk Gastrointestinala bieffekter	Empagliflozin (Jardiance) Kanagliflozin (Invokana) HbA1c-sänkning 10 mmol/mol Viktnedgång Låg hypoglykemirisk Risk för urogenital infektion, ketoacidosis Kanagliflozin – risk för amputation, benfraktur	Liraglutid (Victoza) Semaglutid (Ozempic) Empagliflozin (Jardiance) Kanagliflozin (Invokana) Sitagliptin (Januvia) Linagliptin (Trajenta) Pioglitazon (Pioglitazone) Akarbos (Glucobay) Glimepirid (Glimepirid) Glipizid (Mindiab) Repaglinid (Repaglinid) Basinsulin (Insuman Basal)	Sitagliptin (Januvia) Linagliptin (Trajenta) HbA1c-sänkning 6-8 mmol/mol Viktneutralt Låg hypoglykemirisk Repaglinid (Repaglinid) lakttag försiktighet, starta med låg dos (0,5 mg) till måltiderna (1-3 ggr/dag) och vid behov trappa upp dosen försiktigt. Risk för hypoglykemi och viktuppgång Basinsulin (Insuman Basal) Risk för hypoglykemi och viktuppgång	Sitagliptin (Januvia) Linagliptin (Trajenta) HbA1c-sänkning 6-8 mmol/mol Viktneutralt Låg hypoglykemirisk Basinsulin (Insuman Basal) Risk för hypoglykemi och viktuppgång

* Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 4:2017, tabell VII.

** Alla snabbverkande insulin är likvärdiga och av kostnadsskäl väljs det billigaste alternativet vid nyinsättning och receptförnyelse.

Insulin	
Basinsulin Snabbverkande insulin	(Insuman Basal) (Insulin Lispro Sanofi)**