

Generellt direktiv för läkemedelsbehandling vid Anafylaxi i samband med vaccination

Generellt direktiv om läkemedelsbehandling vid anafylaxi i samband med vaccination för hemsjukvård och särskilda boenden i kommuner i Sörmland, utifrån Anafylaxi 2015, SFFA

Målgrupp: Distriktsköterskor/sjuksköterskor i samtliga kommuner i Sörmlands län

Detta generella direktiv om läkemedelsbehandling vid anafylaxi ska finnas i anslutning till akutask eller i "akut-och buffertförråd" och medtas när vaccination ges.

Vanliga orsaker till anafylaxi: Födoämnen, bi-och getingstick, läkemedel exempelvis vaccin

Adrenalin är det viktigaste läkemedlet och ska ges tidigt och intramuskulärt i låret

Indikation	Läkemedel	Adm.sätt	Dos vuxna	Effekt
Kraftig urtikaria Andnöd Hypotension Allmänpåverkan Kraftiga buksmärtor och kräkningar	Adrenalinpenna (enl. Rek-lista)	Intramuskulärt i lårets utsida	Vuxen 300 µg Vid vikt > 60 kg 500 µg	Inom 5 min. Upprepas vb. var 10:e minut
Astma	Egen bronkvidgande medicin	Inhalation pulver/spray	4-6 doser	Inom 5 min. Upprepas vb. var 10:e minut
Alla	T. Aerius munlöslig 5 mg (eller annan antihistamin i dubbeldos)	Per os	2 tabletter (=10 mg)	Inom 30-60 min
Alla	T. Betapred 0,5 mg	Per os (tuggas, sväljes hela eller löses i vatten)	10 tabletter (=5 mg)	Först efter 2-3 tim

Vid anafylaxi ska patienten akut till vårdcentral eller sjukhus. Ring 112

Underskrift för fastställande

Datum för fastställande

2018-10-11

Medicinsk rådgivare Hälsoval

Divisionschef Primärvård

Namnförtydligande

Namnförtydligande

ANNA ORMEGARD
Divisionschef
Division Primärvård

Giltig t.o.m. 2019-05-31