



## Indragning av Champix (varenekin)

### Indragning av tillverkningssatser på grund av förekomst av N-nitroso-varenekin

Tillverkningssatser av Champix (varenekin) som visat sig innehålla nivåer av N-nitroso-varenekin dras in. Som en försiktighetsåtgärd pausar Pfizer distributionen av läkemedlet i väntan på ytterligare testning.

Baserat på tillgängliga data finns det ingen omedelbar risk för patienter som tar detta läkemedel.

Under tiden EU-myndigheterna fortsätter utvärdera data, bör vårdpersonal, som en försiktighetsåtgärd, inte starta nya patienter på Champix.

Indragningen och pausen i distributionen kommer leda till brist på Champix.

För patienter som redan använder Champix är det kanske inte möjligt att slutföra behandlingen och vårdpersonal kan överväga att byta behandlingen till ett alternativ.

Alternativen varierar på olika marknader men kan inkludera nikotinersättningsterapi (NRT) och bupropion.

Hälso- och sjukvårdspersonal ska också överväga behovet av nedtrappning, eftersom produktresumén (SmPC) anger att "Utsättande av Champix i slutet av behandlingen var förenad med en ökad irritabilitet, röksug, depression och/eller insomni hos upp till 3 % av patienterna."

Vårdgivare bör rekommendera patienter som genomgår behandling att inte avbryta Champix utan att rådfråga dem och diskutera eventuella frågor eller problem med sin vårdgivare vid behov.

[Här kan du läsa mer om indragningen av Champix \(varenekin\)](#)

## Kan läkemedlet krossas?

På webbsidan [lakemedelshantering.se](http://lakemedelshantering.se) kan du få svar. Denna information är framtagen av Region Skåne. Informationen är avsedd för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, innehållet i tjänsten är av allmän och rådgivande karaktär. Den är inte anpassad till varje enskild patient, enskild verksamhet eller annan enskild förutsättning. Du måste själv bedöma om innehållet är tillämpligt i varje aktuell situation.

Denna information går också att ladda hem som app:



[Stöd vid läkemedelshantering – Appar på Google Play](#)



[Stöd vid läkemedelshantering i App Store \(apple.com\)](#)

## Tips vid ordination med receptfavoriter

De centrala receptfavoriterna i NCS Cross är uppdaterade utifrån Läke-medelskommitténs Rekommenderade läkemedel 2020-2021. Används dessa kommer behandlingsorsak och behandlingsändamål att vara förvalt, men går att ändra vid behov. Detta underlättar vid receptförskrivning. Kortet beställs via [lakemedelskommitten@regionsormland.se](mailto:lakemedelskommitten@regionsormland.se)

**TIPS VID ORDINATION MED RECEPTFAVORITER**  
De centrala receptfavoriterna i NCS Cross är uppdaterade utifrån Läke-medelskommitténs Rekommenderade läkemedel 2020-2021. Används dessa kommer behandlingsorsak och behandlingsändamål att vara förvalt, men går att ändra vid behov. Favoritrecept söks fram utifrån de olika terapiområdena i Reklistan, se kortets baksida. Förskrivare är ansvarig för sin ordination då en receptfavorit används. **Hur hittar man rätt receptfavorit?**

Alla receptfavoriter (cirka 850 stycken) nås med § **Tab** (Inget mellanslag följt av Tab-tangent)

**Via diagnos**  
§diabet **Tab** visar alla favoriter för diabetes typ 1 och typ 2. Stjärna (\*) kan läggas till för att söka på ett ord som inte är i början av favoritnamnet eller för att ersätta delar av ett namn.  
§\*smärta **Tab** ger träff på områden där smärta finns i namnet, t.ex "akut smärta" och "neuropatisk smärta" men ger inte träff för "trigeminusneuralgi" då smärta saknas i favoritnamnet.

**Via läkemedelsnamn**  
Vanligen substansnamn eller specifikt läkemedelsnamn.  
§\*metfor **Tab** visar de 9 metforminfavoriterna (favoritnamnen innehåller metformin).  
§\*Forxiga **Tab** visar den favorit för Forxiga som finns. Ingen träff erhålls om sökning görs på substansen dapagliflozin (§\*dapaglif **Tab**) då den inte finns i favoritnamnet.

**Ändra förvald behandlingsorsak**  
Tryck på grön knapp **Ändra orsak** i receptdialogen. Vid val "annan orsak" längst ned kan egen behandlingsorsak och behandlingsändamål skrivas i fritext.

De centrala receptfavoriternas namn har lagts upp utifrån terapiområden i Reklistan och behandlingsorsak i Socialstyrelsens databas. Namnet på favoriten börjar med terapiområdesnamnet t.ex. Astma (29 olika favoriter uppdelade på olika åldrar), §astma **Tab**

**ANDNINGSGORGANEN:** Allergisk rinit; Anafylaxi; Astma; Hosta;  
**KOL:** Rökstopp.  
**DEMENS/KOGNITIV SJUKDOM:** Demens; Depression;  
Ångest, tillfällig; Psykotiska symtom (nydebuterade hos äldre);  
Sömnstörningar.  
**ENDOKRINOLOGI:** Diabetes typ 1; Diabetes typ 2; D-vitaminbrist; Hypotyreoos; Osteoporos.  
**GYNEKOLOGI/UROLOGI:** Akut p-piller; Antikonception;  
Bakteriell vaginos; Blödningssrubbingar; Candida; Dysmenorré; Förskjutning av menstruation; Klimakteriebesvär;  
Trängningsinkontinens; Benign prostatahyperplasi; Erekttil dysfunktion; Njursten.  
**HJÄRTA och KÄRL:** Anemi; Angina pectoris; Förmaksflimmer; Hjärtsvikt; Hypertoni; Kranskärlsjukdom; Lipidrubbing.  
**HUD:** Akne; Avfällning; Bensår; Candida; Eksem; Flatlöss; Fotsvamp; Hudsvamp, ytlig; Impetigo; Nagelsvamp; Psoriasis; Perioral dermatit; Rosacea; Skabb; Torr hud; Urtikaria.  
**INFEKTION:** Borrelia; Cystit; Erysipelas; Clostridieinfektion; Febril UVI; Genital klamydia; Herpes simplex; Herpes zoster; Influensa; Infektion, hundbett; Infektion, kattbett; Infektion, människobett; KOL-exacerbation; Kondylom; Mediaotit; Pneumoni; Sinuit; Sårinfektioner; Tonsillit.  
**MAGE och TARM:** Analfissur, kronisk; Diarré; Förstoppning; Hemorrojder; Illamående; Infr DT-colon; Magsår, eradikering H. pylori; Magsår, förebyggande NSAID-relaterade sår; Magsår, refluxesofagit; Magsår, refluxsjukdom (symtomatisk behandling).  
**MUN- och TANDVÅRD:** Endokarditprofylax; Kariesrisk; Munslimhinneförändringar; Muntorrhet.  
**NEUROLOGI:** Epilepsi, akut; Migrän; Restless legs.  
**PSYKIATRI:** Alkoholsjukdom; Depression; Psykotiska symtom (nydebuterade hos äldre); Sömnstörningar; Ångest (panik-ångest, tillfällig ångest samt ångestsyndrom).  
**SMÄRTA:** Akut inflammatorisk smärta; Akut smärta; Artros; Gikt; Ledinflammatorisk sjukdom; Muskuloskeletal smärta; Neuropatisk smärta; Smärta vid cancer; Tandvärk; Trigeminusneuralgi.  
**ÖGON:** Allergisk konjunktivit; Torra ögon; Ögoninfektioner.  
**ÖRON:** Extern otit.

Läke-medelskommittén, tryckt augusti 2021

## Nya beviljade regionlicenser

### Substans, läkemedelsform och styrka

ceftibuten, tablett 400 mg  
klonidin, tablett 75 µg  
magnesiumsulfat, infusion, 2,5 g/10 ml  
propofol, Inj/inf 10 mg/ml emulsion  
calciumgluconat, inj 10 % 20x10 ml

[Läs mer om regionlicenser på samverkanswebben](#)

Ansvarig utgivare: Lars Steen

Redaktion: Ann-Charlotta Jakobsson, Björn Lundahl, Maria Nordqvist

E-post: [lakemedelskommitten@regionsormland.se](mailto:lakemedelskommitten@regionsormland.se)

[Vill du prenumerera på Läke-medelskommitténs olika nyhetsbrev?](#)

[Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?](#)