

Forskningsprojekt 2020

Titel: Karakteristika av positionell nystagmus i korrelation till balanstester.

Namn: Achilleas Gourbaliotis, Specialistläkare, Öron-näsa- och halskliniken
Region Sörmland

Sammanfattning:

Den vanligaste typen av akut insättande öronrelaterad yrsel är den så kallad godartad lägesyrsele. Den uppkommer vid huvudrörelser exempelvis när vederbörande lägger sig ner, reser sig upp eller intar olika huvudpositioner i sängliggande. Den kontinuerliga typen av lägesyrsele kännetecknas av ihållande yrsel och nystagmus. Patofysiologin bakom den störningen är ej klarlagd. Tidigare forskning visat att patienter kan ha olika typer av störningar i balansorganet och övriga delar av CNS som kan ge ihållande nystagmus. Vi ville analysera korrelation mellan olika diagnoser, patientens mående (uppmätt med frågeförmulär) och objektiva tester såsom kaloriska provet, VEMP och vHIT. Den första delen av studie är retrospektiv. De undersökningarna är väl standardiserade på kliniken. Samtliga undersökningar sparats i undersökningsprogrammet och i journalsystemet och är sekretesskyddade. Målet med projektet är att hitta kliniska verktyg som kan hjälpa oss att skilja mellan central och otogen positionell nystagmus.